

PERBANDINGAN STROKE NON HEMORAGIK DENGAN GANGGUAN MOTORIK PADA PASIEN YANG MEMILIKI FAKTOR RESIKO DIABETES MELITUS, HIPERTENSI, DIABETES MELITUS & HIPERTENSI DI RSUD DR.H ABDUL MOELOEK

COMPARISON OF NON-HEMORRHAGI STROKE WITH MOTOR DISORDERS IN PATIENTS WHO HAVE RISK FACTORS OF DIABETES MELLITUS, HYPERTENSION, DIABETES MELLITUS AND HYPERTENSION IN RSUD DR.H ABDUL MOELOEK

Dharmawita¹, Ni Putu sudiadnyani², Fitriyani², Nia Permatasari³

¹RSUD DR.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

²Staf Pengajar, Fakultas Kedokteran, Universitas Malahayati, Lampung

³Mahasiswa Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Malahayati, Lampung

Korespondensi: niapermatasari200@gmail.com

ABSTRACT

Stroke in Indonesia has also increased in prevalence. In Indonesia, this disease ranks third after heart disease and cancer. In 2007, the results of the Basic Health Research (Riskesdas) showed data 8.3 per 1000 population suffered a stroke. Stroke was also the main cause of death in almost all hospitals in Indonesia, which amounted to 14.5%. To find out how Comparison of Motor Disorders in Non-Hemorrhagic Stroke Patients with Risk Factors for Diabetes Mellitus, Hypertension, Diabetes Mellitus & Hypertension in RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Province in 2018. The design of this study was descriptive-analytic with the cross-sectional approach. The subjects of this study were all patients with motor disorders in non-hemorrhagic stroke with risk factors for diabetes mellitus, hypertension, diabetes mellitus, and hypertension in RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Province. The study sample was 30 patients. Non-hemorrhagic stroke in hypertensive patients as much as (92.6%), non-hemorrhagic stroke in patients with diabetes mellitus (81.5%), non-hemorrhagic stroke in hypertensive patients and diabetes mellitus as much as (74.1%). By using the Kolmogorov-Smirnov Z test the significant value is 0.280 ($p = 0.280 > \alpha = 0.05$) then H_0 is accepted. There is no comparison of hypertension in non-hemorrhagic stroke with mild and moderate motor disturbances at Dr.H. Abdul Moeloek Lampung Province in 2018.

Keywords: Motor Disorders, Non-Hemorrhagic Stroke, Hypertension, Diabetes Mellitus.

ABSTRAK

Stroke di Indonesia juga mengalami peningkatan prevalensi. Di Indonesia penyakit ini menduduki posisi ketiga setelah jantung dan kanker. Pada tahun 2007, hasil Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan data 8,3 per 1000 penduduk menderita stroke. Stroke juga menjadi penyebab kematian utama di hampir semua rumah sakit di Indonesia, yakni sebesar 14,5%. Mengetahui bagaimana Perbandingan Gangguan Motorik Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Pasien Dengan Faktor Resiko Diabetes Melitus, Hipertensi, Diabetes Melitus & Hipertensi Di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018. Rancangan penelitian ini adalah Analitik Deskriptif dengan pendekatan secara *Cross sectional*. Subjek penelitian ini seluruh pasien Gangguan Motorik Pada Stroke Non Hemoragik Dengan Faktor Resiko Diabetes Melitus, Hipertensi, Diabetes Melitus dan Hipertensi di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Sampel penelitian ini 30 pasien. Stroke non hemoragik pada pasien hipertensi sebanyak (92,6%), stroke non hemoragik pada pasien diabetes melitus sebanyak (81,5%), Stroke non hemoragik pada pasien hipertensi dan diabetes melitus sebanyak (74,1%). Dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z* nilai signifikannya adalah 0,280 ($p=0,280 > \alpha=0,05$) maka H_0 diterima. Tidak ada perbandingan hipertensi pada stroke non hemoragik dengan gangguan motorik ringan dan sedang di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018.

Kata Kunci: Gangguan Motorik, Stroke Non Hemoragik, Hipertensi, Diabetes Melitus

PENDAHULUAN

Menurut *World Health Organization* (WHO) stroke merupakan gejala yang didefinisikan suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik baik fokal maupun global yang berlangsung 24 jam atau lebih (Nasution, 2013).

Stroke di Indonesia juga mengalami peningkatan prevalensi. Di Indonesia penyakit ini menduduki posisi ketiga setelah jantung dan kanker. Pada tahun 2007, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan data 8,3 per 1000 penduduk menderita stroke. Sedangkan pada tahun 2013, terjadi

peningkatan yaitu sebesar 12,1%. Stroke juga menjadi penyebab kematian utama di hampir semua rumah sakit di Indonesia, yakni sebesar 14,5%. Jumlah penderita stroke di Indonesia menurut diagnosis tenaga kesehatan (Nakes) pada tahun 2013, diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang dari seluruh penderita stroke yang terdata, sebanyak 80% merupakan jenis stroke iskemik (Wicaksana, 2017).

Berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan maupun diagnosis/gejala, Provinsi Jawa Barat memiliki estimasi jumlah penderita terbanyak yaitu sebanyak 238.001 orang (7,4%) dan

533.895 orang (16,6%), sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki jumlah penderita paling sedikit yaitu sebanyak 2.007 orang (3,6%) dan 2.955 orang (5,3%) (Riskesdas, 2013; Pusdatin, 2014). Prevalensi kejadian stroke di Provinsi Lampung berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebanyak 42.851 orang (7,7%) dan berdasarkan diagnosis/gejala sebanyak 68.393 orang (12,3%) (Pusdatin, 2014). Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, prevalensi kejadian stroke berkisar antara 2,2– 10,5%. Kotamadya Bandar Lampung mempunyai prevalensi lebih tinggi dibandingkan dengan Kotamadya/Kabupaten yang ada di Propinsi Lampung, baik berdasarkan diagnosis maupun berdasarkan gejala (Tuntun, 2018).

Terdapat beberapa faktor resiko terjadinya stroke non hemoragik, antara lain: usia lanjut, hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, hiperkolesterolemia, merokok dan kelainan pembuluh darah otak. Pada tahun 2011 WHO memperkirakan sebanyak 20,5 juta jiwa di dunia menderita stroke, dari jumlah tersebut 5,5 juta jiwa telah meninggal dunia. Penyakit darah tinggi atau hipertensi

menyumbangkan 17,5 juta kasus stroke di dunia (Nasution, 2013).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan faktor resiko diabetes melitus, hipertensi, diabetes melitus dan hipertensi, peluang untuk terjadinya stroke non hemoragik lebih meningkat. Oleh karena itu untuk membuktikan hal ini, akan dilakukan penelitian mengenai perbandingan stroke non hemoragik dengan gangguan motorik pada pasien yang memiliki faktor resiko diabetes melitus, hipertensi, diabetes melitus & hipertensi di RSUD DR. H Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif merupakan definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentase tanggapan mereka.

Pada pasien yang terdiagnosa stroke non hemoragik dengan faktor resiko diabetes melitus, hipertensi, diabetes melitus & hipertensi di RSUD DR. H Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Rancangan penelitian ini adalah Analitik Deskriptif dengan pendekatan secara *Cross sectional*. *Cross sectional* adalah suatu penelitian yang dilakukan pada satu saat atau pada satu periode waktu tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien Gangguan Motorik Pada Stroke Non Hemoragik Dengan Faktor Resiko Diabetes Melitus, Hipertensi, Diabetes Melitus & Hipertensi di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Total Sampling. *Total Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30.

Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu:

1. Pasien Stroke Non Hemoragik Dengan Gangguan Motorik.
2. Pasien Stroke Non Hemoragik Yang Memiliki Faktor Resiko DM.
3. Pasien Stroke Non Hemoragik Yang Memiliki Faktor Resiko Hipertensi.
4. Memiliki faktor resiko HT dan DM.

Kriteria Eksklusi :

Pasien Stroke Non Hemoragik Dengan Gangguan Motorik Yang Memiliki Faktor Resiko Lain Seperti: Hiperkolesterol, Asam Urat, Gangguan Jantung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Stroke Non Hemoragik di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018.

Stroke Non Hemoragik	Jumlah	Presentase (%)
Ada penyumbatan	30	100%
Total	30	100%

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa pasien stroke non hemoragik di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi

Lampung Tahun 2018, dengan penyumbatan sebanyak 30 pasien (100%) .

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Stroke Non Hemoragik Dengan Gangguan Motorik di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018

Hipertensi	Jumlah	Presentase (%)
Normal (<140)	3	10,0%
Hipertensi (>140)	27	90,0%
Total	30	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari keseluruhan pasien yang berjumlah 30 pasien di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Tahun 2018, pasien terbanyak yang mengalami hipertensi dengan penyumbatan sebanyak 27 pasien (90,0%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Diabetes Melitus pada Stroke Non Hemoragik Dengan Gangguan Motorik di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018.

Diabetes Melitus	Jumlah	Presentase (%)
Normal (<200 g/dL)	6	20%
Tinggi (>200 g/dL)	24	80%
Total	30	100%

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa dari keseluruhan pasien yang berjumlah 30 pasien di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Tahun 2018, pasien terbanyak yang mengalami diabetes melitus sebanyak 24 pasien (80%).

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Diabetes Melitus & Hipertensi pada Stroke Non Hemoragik Dengan Gangguan Motorik di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018.

Diabetes Melitus & Hipertensi	Jumlah	Presentase (%)
Ya	21	70%
Tidak	9	30%
Total	30	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari keseluruhan pasien yang berjumlah 30 pasien di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Tahun 2018, pasien terbanyak yang mengalami diabetes melitus & hipertensi sebanyak 21 pasien (70%).

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Gangguan Motorik pada Stroke Non Hemoragik di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018

Gangguan Motorik	Jumlah	Presentase (%)
Sedang (2-3)	27	90%
Ringan (4-5)	3	10%
Total	30	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari keseluruhan pasien yang berjumlah 30 pasien di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Tahun 2018, pasien terbanyak pada yang mengalami gangguan motorik sebanyak 27 pasien (90%).

Analisis Perbandingan Stroke Non Hemoragik Dengan Gangguan Motorik Pada Pasien Hipertensi di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018.

	Gangguan Motorik						P Value
	Ringan		Sedang		Total		
Hipertensi	N	%	N	%	N	%	
Normal ($\leq 140/80$ mm/Hg)	1	33,3%	2	7,4%	3	10,0%	0,280
Hipertensi ($\geq 140/90$ mm/Hg)	2	66,7%	25	92,6%	27	90,0%	
Total	3	100%	27	100%	30	100,0%	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil analisis perbandingan stroke non hemoragik terbanyak pada

pasien hipertensi ($\geq 140/80$ mmHg) dengan gangguan motorik sedang sebanyak 25 pasien (92,6%).

Tabel 2x2 ini tidak layak untuk di uji *Chi-Square* karena terdapat 3 nilai *Expected Count* yang kurang dari 5 ada 75% jumlah sel. Oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya, yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov Z*. Hasil uji statistic menggunakan uji *Kolmogorov-*

Smirnov Z nilai signifikannya adalah 0,280, karena nilai $p=0,280 > \alpha=0,05$, maka H_0 diterima artinya Tidak ada perbandingan hipertensi pada Stroke Non Hemoragik dengan gangguan motorik ringan dan sedang di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018.

Analisis Perbandingan Stroke Non Hemoragik Dengan Gangguan Motorik Pada Pasien Diabetes Melitus di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018.

Diabetes Melitus	Gangguan Motorik				Total		P Value
	Ringan		Sedang		N	%	
	N	%	N	%			
Normal (≤ 200 g/dL)	1	33,3%	5	18,5%	6	20,0%	0,501
Diabetes Melitus (≥ 200 g/dL)	2	66,7%	22	81,5%	24	80,0%	
Total	3	100%	27	100%	30	100,0%	

Berdasarkan tabel diketahui bahwa hasil analisis perbandingan Stroke Non Hemoragik dengan Diabetes Melitus, terbanyak pada Diabetes Melitus dengan gangguan motorik sedang (≥ 200 g/dL) dengan penyakit Stroke Non Hemoragik ada penyumbatan sebanyak 22 pasien (81,5%).

Tabel 2x2 ini tidak layak untuk di uji *Chi-Square* karena terdapat 2 nilai *Expected Count* yang kurang dari 5 ada 50% jumlah sel. Oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya, yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov Z*. Hasil uji statistic menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z* nilai signifikannya adalah 0,501, karena nilai $p=0,501 > \alpha=0,05$,

maka H_0 diterima artinya Tidak ada perbandingan Diabetes Melitus pada pasien Stroke Non Hemoragik dengan

gangguan motorik ringan dan sedang di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018.

Analisis Perbandingan Stroke Non Hemoragik Dengan Gangguan Motorik Pada Pasien Hipertensi & Diabetes Melitus di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018

	Gangguan Motorik						P Value
	Ringan		Sedang		Total		
	N	%	N	%	N	%	
Hipertensi & Diabetes Melitus							
Ya	1	33,3%	20	74,1%	21	30,0%	0,207
Tidak	2	66,7%	7	25,9%	9	70,0%	
Total	3	100%	27	100%	30	100,0%	

Berdasarkan tabel diketahui bahwa hasil analisis perbandingan Stroke Non Hemoragik dengan Hipertensi & Diabetes Melitus, terbanyak pada pasien yang memiliki riwayat Hipertensi & Diabetes Melitus ($\geq 140/90$ mmHg dan ≥ 200 g/dL) dengan gangguan motorik sedang sebanyak 20 pasien (74,1%).

Tabel 2x2 ini tidak layak untuk di uji *Chi-Square* karena terdapat 2 nilai *Expected Count* yang kurang dari 5 ada 50% jumlah sel. Oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya, yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov Z*. Hasil uji statistic

menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z* nilai signifikannya adalah 0,207, karena nilai $p=0,207 > \alpha=0,05$, maka H_0 diterima artinya Tidak ada perbandingan Hipertensi & Diabetes Melitus pada penyakit Stroke Non Hemoragik ada penyumbatan di RSUD Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai perbandingan Stroke Non Hemoragik dengan faktor resiko Hipertensi, Diabetes Melitus, Hipertensi & Diabetes Melitus, yang mengalami gangguan motorik sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada hasil penelitian ini seharusnya pasien dengan faktor resiko Hipertensi, Diabetes Melitus, Hipertensi & Diabetes Melitus yang mengalami kelainan motorik sedang harusnya lebih tinggi dibanding yang hanya memiliki satu faktor resiko. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya seperti pengambilan sampel yang tidak melihat onset serangan pasien. Hal tersebut dimaksudkan pada onset akut biasanya dikenal dengan hiperglikemia reaktif.

Hiperglikemia merupakan akibat respon stress sesudah terjadi Stroke. Respon stress ini mengakibatkan peningkatan Katekolamin, Lipolisis, kenaikan kadar Asam Lemak Bebas, dan hal itu merupakan prognosis buruk. Hiperglikemia dapat menyebabkan berkurangnya konsumsi Oksigen otak pasca iskemik dibandingkan pada pasien dengan Normoglikemia. Hiperglikemia reaktif akan mempengaruhi proses penyembuhan, memperberat akibat stroke iskemik, dan juga mempercepat rekuren atau kekambuhan Stroke. Keadaan Hiperglikemia juga mempermudah terjadinya edem otak dan meningkatkan angka kematian pasien yang dirawat akibat Stroke (Yanis,2004).

Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa hasil analisis perbandingan gangguan motorik penyakit Stroke Non Hemoragik dengan penyumbatan terbanyak pada gangguan motorik sedang (2-3) 27 pasien (90%).

Pada penelitian ini didapatkan hasil uji statistik Stroke Non Hemoragik menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* Z nilai signifikannya adalah 0,00, karena nilai $p=0,00 > \alpha=0,05$, maka H_0 diterima artinya Tidak ada perbandingan gangguan motorik pada penyakit stroke non hemoragik ada penyumbatan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018. Stroke merupakan kerusakan organ target pada otak yang diakibatkan oleh Hipertensi. Stroke timbul karena perdarahan, tekanan intra kranial yang meninggi, atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non otak yang terpajan tekanan tinggi. Apabila terjadi peningkatan salah satu dari variabel tersebut yang tidak terkompensasi maka dapat menyebabkan timbulnya hipertensi. Tubuh memiliki sistem yang berfungsi mencegah perubahan tekanan darah secara akut yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi dan mempertahankan stabilitas tekanan

darah dalam jangka panjang. Kegagalan dalam mensuplai darah akan menyebabkan gangguan fungsi bagian otak atau yang terserang atau terjadi kematian sel saraf (nekrosis) dan kejadian inilah yang disebut stroke. Salah satu penyebab meningkatnya kasus penyakit pembuluh darah, seperti jantung dan stroke adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola gaya hidup sehat (Junaidi, 2011). Modifikasi pola hidup dengan mematuhi diet merupakan langkah pencegahan yang baik. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kejadian Hipertensi adalah dengan melakukan program gaya hidup sehat, modifikasi gaya hidup membantu termasuk pengurangan berat badan, pembatasan natrium, diet banyak makan buah, sayuran dan hasil olahan rendah lemak, olahraga teratur, dan tidak berlebihan konsumsi alkohol. Apabila penyakit ini tidak terkontrol, akan menyerang target organ, dan dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, gangguan ginjal, serta kebutaan. Dari beberapa penelitian dilaporkan bahwa penyakit hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peluang tujuh kali lebih besar terkena Stroke (Fitri, 2009).

Diabetes Melitus adalah kondisi dimana terjadi peningkatan insulin dalam darah pada Diabetes Melitus yang dewasa ini semakin meningkat jumlahnya di masyarakat, kondisi tersebut meningkatkan penyerapan jumlah natrium didalam tubuh. Penyerapan natrium akan meningkatkan kadar kalium dalam darah dan akan menyebabkan terstimulasikan sistem saraf simpatik. Hal ini diduga menyebabkan perubahan struktur dalam darah yang mempengaruhi fungsi jantung dan tekanan darah. Masalah vaskular yang timbul dikarenakan diabetes dan diperparah dengan hipertensi, pola makan yang tidak baik serta kurangnya aktivitas fisik. Sehingga diabetes melitus adalah kondisi dimana secara tidak langsung akan mempengaruhi untuk terjadinya Hipertensi (Ramadany, 2013).

Pada penelitian ini Stroke Non Hemoragik pada gangguan motorik dengan ada penyumbatan dan tidak ada penyumbatan didapat hasil usia manula >65 tahun dengan penyakit Stroke Non Hemoragik memiliki gangguan motorik sedang (2-3) sedangkan usia manula >65 tahun dengan penyakit stroke non hemoragik memiliki gangguan motorik

ringan (4-5). Hasil uji statistik menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* Z nilai signifikannya adalah 0,00, karena nilai $p=0,00 > \alpha=0,05$. Pengukuran dengan menggunakan gangguan motorik didapatkan Hipertensi ($\geq 140/90$ mmHg) pada penyakit stroke non hemoragik dengan gangguan motorik sedang (2-3). Pengukuran dengan menggunakan gangguan motorik didapatkan diabetes mellitus tinggi (≥ 200 g/dL) pada penyakit stroke non hemoragik. Pengukuran dengan menggunakan gangguan motorik didapatkan hipertensi & diabetes melitus tinggi ($\geq 140/90$ mmHg dan ≥ 200 g/dL) dengan penyakit stroke non hemoragik ada penyumbatan. Pengukuran dengan menggunakan gangguan motorik didapatkan gangguan motorik sedang (2-3) dengan adanya penyumbatan. Hasil uji statistik menggunakan uji *Chi-Square* nilai signifikasinya adalah 0,280, karena nilai $p=0,280 > \alpha=0,05$. Kelainan motorik ringan, sedang maupun berat dapat terjadi apabila letak atau lokasinya infark pada jarak atau homonkulus yang mengenai motoriknya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, analisis data, dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini didapatkan gangguan motorik pada pasien stroke non hemoragik dengan faktor resiko Hipertensi, Diabetes Melitus, Hipertensi & Diabetes Melitus lebih banyak dengan gangguan motorik sedang, dengan yang memiliki faktor resiko Hipertensi atau Diabetes Melitus saja.
2. Distribusi frekuensi Stroke Non Hemoragik dengan gangguan motorik, terbanyak penyumbatan dengan gangguan motorik sedang sebanyak 27 pasien (90,0%).
3. Distribusi frekuensi Stroke Non Hemoragik pada pasien Hipertensi dengan gangguan motorik sedang, sebanyak 25 pasien (92,6%).
4. Distribusi frekuensi Stroke Non Hemoragik pada pasien Diabetes Melitus dengan gangguan motorik sedang, sebanyak 22 pasien (81,5%).
5. Distribusi frekuensi Stroke Non Hemoragik pada pasien Hipertensi & Diabetes Melitus dengan gangguan motorik sedang, sebanyak 20 pasien (74,1%).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, W., Wahyuddin (2008). Pengaruh Pemberian Pnf Terhadap Kekuatan Fungsi Prehension Pada Pasien Stroke Hemoragik Dan Non- Hemoragik. *Jurnal Fisioterapi Indonusa* 8(1) : 89.
- Dinata, A.C., Safrita, Y., Sastri, S. (2013). Gambaran Faktor Risiko dan Tipe Stroke pada Pasien Rawat Inap di Bagian Penyakit Dalam. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 2(2) : 58.
- Erni, E., Lestari, T.D., Astuti, R. (2017). Pengaruh Modifikasi Constraint Induced Movement Therapy Dan Rom Terhadap Kemampuan Motorik Pada Pasien Stroke Non Hemoragik [skripsi]. Semarang. STIKES Telogorejo.
- Fitri, R.D., (2009). Diagnose Enforcement And Treatment Of High Blood Pressure. *Jurnal Majority*. 4(3) : 50.
- Ginsberg, L. (2007). *Lecture Notes Neurology*. (Edisi 8). Jakarta: ERLANGGA.
- Handayani, S.D., Rusli, R., Ibrahim, A. (2015). Analisis Karakteristik Dan Kejadian *Drug Related Problems* Pada Pasien Hipertensi. *Jurnal Sains dan Kesehatan*. 1(2) : 75.
- Irdelia, R.R., Joko, T.A., Bebasari, E. (2014). Profil Faktor Risiko Yang Dapat Dimodifikasi Pada Kasus Stroke Berulang. *Jom FK* 1(2) : 9.
- Junaidi, I. (2011). *STROKE Waspada! Ancamannya*. (Edisi 1). Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Kartikasari, N.A. (2012). Faktor Risiko Hipertensi Pada Masyarakat Di Desa Kabongan Kidul, Kabupaten Rembang [skripsi]. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, C. (2014). Hubungan Faktor Risiko Hipertensi Dan Diabetes Mellitus Terhadap Keluaran Motorik Stroke Non Hemoragik [skripsi]. Universitas Diponegoro.
- Nasution, L.F. (2013). Stroke Non Hemoragik Pada Laki-Laki Usia 65 Tahun. *Jurnal Medula*, 1(3) : 2-7.
- Nuraini, B. (2015). *Risk Faktor Of Hypertension*. *Jurnal Majority*, 4(5) : 13-16.
- Rahayu, E., Kamaluddin, R., Sumarwati, M. (2014). Pengaruh Program Diabetes *Self Management Education* Berbasis Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe II. *Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing)*. 9(3) : 164.
- Ramadany, F.A., Pujarini, A.L., Candrasari, A. (2013). Hubungan Diabetes Melitus Dengan Kejadian Stroke Iskemik. *Jurnal Biomedika*. 5(2) : 12-14.
- Susilo, Y. (2011). Cara Jitu Mengatasi Hipertensi. (Edisi 1). Yogyakarta: ANDI.
- Syamsiyah, N. (2017). *Berdamai dengan Diabetes*. Jakarta: Tim Bumi Medika.
- Triasti, P.A., Pudjonarko, D. (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif Penderita Stroke Non Hemoragik. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*. 5(4) : 462.
- Tuntun, M. (2018). *Difference Hemoglobin Levels, Value Of Hematocrit And Amount Of Erythrocytes On Hemorrhagic Stroke And Non Hemorrhagic Stroke In RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung*. *Jurnal Analisis Kesehatan : Volume 7*.(2) : 725.
- Wicaksana, P.E.I., Wati, P.A., Muhartomo, H. (2017). Perbedaan Jenis Kelamin Sebagai Faktor Risiko Terhadap Keluaran Klinis Pasien Stroke Iskemik. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*. 6(2) : 656.
- Wirawan, P.R., (2009). Rehabilitasi Stroke pada Pelayanan Kesehatan Primer. *Jurnal Majority Kedokteran Indonesia*. 59(2) : 64.
- Yaris, H. (2004). Pola Kadar Glukosa Darah Pada Stroke Akut [skripsi]. Universitas Diponegoro.